

核准日期: 2007年 06 月 27 日
修订日期: 2011年 05 月 23 日
修订日期: 2014年 11 月 21 日

依托泊苷胶囊说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用。

【药品名称】

通用名称: 依托泊苷胶囊

商品名称: 拉司太特

英文名称: Etoposide Capsules


汉语拼音: yituoopogan jiaonang

【成份】

主要成份: 依托泊苷, 每一依托泊苷胶囊中含依托泊苷25mg; 添加物聚乙二醇, 对羟基甲酸乙酯及对羟基苯甲酸丙酯。

化学名称: (-) (5R, 5Ar, 8Ar, 9S) -9-[[[4, 6-O-(R) -亚乙基-D-吡喃葡萄糖酰]氧代]-5, 8, 8a, 9-四氢-5-(4-羟基-3, 5-二甲氧基苯) 呋喃[3', 4' : 6, 7]萘并[2, 3-d]-1, 3-二氧代-6 (5aH) -酮。

化学结构式为:



分子式: $C_{29}H_{32}O_{13}$

分子量: 588.57

【性状】本品为软胶囊, 内容物为无色或浅黄色透明黏液性液体。

【适应症】小细胞肺癌, 恶性淋巴瘤。

【规格】25mg

【用法用量】

本药为剧毒药物, 一定要在医生指导下服用。一般成人每日175~200mg, 连续服用5天, 停药3周, 或每日50~75mg, 连续服用21天, 停药一周为一个疗程。每一个疗程约1000mg, 可连续2~3个疗程。药量及疗程根据病情和症状的严重性适当增减。

【不良反应】

1. 血液 白细胞减少, 血小板减少, 出血和贫血。
2. 肝脏 有时引起COP, GPT, AL-P胆红素升高。
3. 肾脏 有时出现BUN升高。
4. 消化 有时有恶心呕吐, 食欲不振, 口腔炎, 腹痛, 腹泻, 便秘等。
5. 过敏 有时有皮肤红疹, 红斑, 瘙痒。
6. 皮肤 有时有严重的脱毛。
7. 神经 偶有四肢麻木, 头痛等。
8. 循环系统 可出现心电图改变, 不整脉, 低血压等。
9. 呼吸系统 可出现间质性肺炎。
10. 其它 有时出现倦怠, 疲劳。

【禁忌】骨髓机能障碍, 对本剂严重过敏者。